

Softasept® BZ

Gebrauchsfertige, alkoholische Lösung zur Desinfektion

SCHNELL WIRKSAM

ZUR SCHNELLEN DESINFEKTION DER ZU BEHANDELNDEN **HAUTPARTIE**

- Kurze Einwirkzeit (ab 15 Sekunden)
- Ohne mikrobizide Zusatzwirkstoffe
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota- und Polioviren
- Trocknet schnell
- Biozid Hauptgruppe I

Gleichwertiges Produkt Softasept® N ist DGHM/VAH gelistet



WIRKSPEKTRUM/EINWIRKZEITEN (EZ)

EINSATZGEBIET	EZ	
bei talgdrüsenarmer Haut* vor Injektionen und Punktionen vor Gelenkpunktionen, Punktionen des Liquorraumes	mind. 15 Sek. mind. 60 Sek.	
bei talgdrüsenreicher Haut*	mind. 2,5 Min.	
Tuberkulozid, EN 14348	15 Sek.	
Viruswirksamkeit (in vitro)		
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)	15 Sek.	
Adenovirus, EN 14476	30 Sek.	
Norovirus (MNV), EN 14476	30 Sek.	
Poliovirus, EN 14476	60 Sek.	
Rotavirus DVV/RKI	60 Sek.	

^{*} nach DGHM-/VAH-Richtlinien

HINWEISE ZUR ANWENDUNG UND DOSIERUNG

Softasept® BZ unverdünnt auftragen und zu behandelnde Hautpartien vollständig benetzen. Während der vorgeschriebenen Einwirkungszeit feucht halten. Nach der Einwirkungszeit trocknen lassen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

VE	ArtNr.	PZN
20	180237	
10	180238	
1	180239	
	20	10 180238

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Ethanol (100 %) 74,1 g, 2-Propanol 10,0 g; sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser. Warnhinweise: Leicht entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen! Nicht in offene Flamme sprühen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zum äußerlichen Gebrauch bestimmt. 14 °C Flammpunkt nach DIN 51755. Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich.

😝 www.facebook.com/bbraunat | 🧿 www.instagram.com/bbraun_at | in_ www.linkedin.com/company/bbraun-group